

Una guía para el manejo de las convulsiones de inicio parcial (focales)

A guide to managing your partial-onset (focal) seizures

No son pacientes reales.
No actual patients are depicted.

Colabora con tu equipo de atención médica Work with your healthcare team

Tomar BRIVIACT solo o con tu tratamiento actual puede ayudarte a tener menos convulsiones focales.

INDICACIÓN

BRIVIACT® (brivaracetam) CV es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones de inicio parcial en personas de un mes de edad o más.

Taking BRIVIACT alone or with your current treatment may help you have fewer focal seizures.

INDICATION

BRIVIACT® (brivaracetam) CV is a prescription medicine used to treat partial-onset seizures in people 1 month of age and older.

Por favor, leer la información de seguridad importante en las páginas 6 y 7, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

Please see Important Safety Information on pages 6 and 7, and additional patient information in the Medication Guide.

BRIVIACT®
(brivaracetam) CV 

Prepárate para tu próxima visita al médico

Si padeces convulsiones focales, tienes mucho que considerar al momento de buscar un plan de tratamiento que funcione mejor para ti.

Trabajar en equipo con tu médico es una forma importante de controlar tu propia salud. Así, tú y tu familia tienen la misma meta: mejor tratamiento y control de tus convulsiones.

Usa esta guía para ayudarte a iniciar la conversación en tu próxima visita al médico.

Esta información es para que aprendas más y mejores la comunicación con tu médico.

<p>COMPARTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tu diario de las convulsiones • La frecuencia de tus convulsiones • Lo que haya desencadenado tu convulsión • Cómo fue tu convulsión • Tus sentimientos sobre tus convulsiones y cómo afectan tu vida • Otros medicamentos que estés tomando • _____ 	<p>PREGUNTA</p> <p>Sobre convulsiones focales</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué son las convulsiones focales? • ¿Qué causan las convulsiones focales? • ¿Cómo sé si voy a tener una convulsión? • ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes de las convulsiones? • ¿Cómo puedo evitar los desencadenantes? • ¿Qué necesitas saber de mí y mis convulsiones? • ¿Cómo sería el control de convulsiones en mi caso?
<p>COMPARTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cómo estás tomando tus medicamentos • La hora del día que tomas tus medicamentos • Si omitiste alguna dosis y por qué • Si tienes efectos secundarios • Algún cambio de humor, personalidad o energía • Cualquier cosa que esté interfiriendo con tu tratamiento de la epilepsia • _____ 	<p>PREGUNTA</p> <p>Sobre tratamientos</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo determinas cuáles son los tratamientos adecuados para mí? • ¿Qué información necesitas para tomar esa decisión? • ¿Es común que personas como yo tomen más de un medicamento para las convulsiones? • ¿Voy a continuar con un tratamiento por un largo periodo de tiempo? • ¿Me recetarán terapias adicionales en el futuro? • ¿Es la cirugía una opción para mí? • ¿Cómo puedo manejar los efectos secundarios de mi medicamento? • ¿Si no puedo manejar mis efectos secundarios, podemos hablar sobre cambiar mis medicamentos?
<p>COMPARTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • La guía para establecer metas • Tus metas personales y con el tratamiento • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ 	<p>PREGUNTA</p> <p>Cómo organizar tu día a día</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo hablo con mis amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre mis convulsiones? • ¿Hay organizaciones de apoyo para personas con epilepsia cerca de mí? • ¿Hay recursos de apoyo en internet que recomiendes? • ¿Hay alguna terapia o servicio de apoyo al empleo que recomiendes? • ¿En qué tipo de actividades debo tener cuidado al participar? • ¿Cómo puede afectar a mi vida tomar uno o más medicamentos antiepilépticos?

Por favor, leer la información de seguridad importante en las páginas 6 y 7, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

Prepare for your next doctor's appointment

Having focal seizures means you have a lot to consider as you look for a treatment plan that works best for you.

Working as a team with your doctor is one important way you can take control of your own health. This way, you and your family are headed toward the same goal: better treatment and control of your seizures.

Use this guide to help you get the conversation started at your next visit to the doctor.

This information is for you to learn more and to improve communication with your doctor.

<p>SHARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Your Seizure Diary • The frequency of your seizures • What may have triggered your seizure • What your seizure was like • Your feelings about your seizures and how they are affecting your life • Other medications that you are currently taking • _____ 	<p>ASK</p> <p>About focal seizures</p> <ul style="list-style-type: none"> • What are focal seizures? • What causes focal seizures? • How will I know if I'm going to have one? • What are the common triggers of seizures? • How do I avoid triggers? • What do you need to know about me and my seizures? • What would seizure control look like in my case?
<p>SHARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • How you are taking your medications • The time of day you take your medications • If you missed any doses and why • If you are experiencing side effects • Any changes in mood, personality, or energy • Anything that is getting in the way of treating your epilepsy • _____ 	<p>ASK</p> <p>About treatments</p> <ul style="list-style-type: none"> • How do you determine which treatments might be right for me? • What information do you need to make that decision? • Is it common for people like me to take more than 1 medication for seizures? • Will I stay on one treatment for a long period of time? • Will I receive more add-on therapies in the future? • Is surgery an option for me? • How can I manage the side effects of my medication? • If I cannot manage my side effects, can we discuss a change in my medications?
<p>SHARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Setting Goals tool • Your personal and treatment goals • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ 	<p>ASK</p> <p>How to organize your day-to-day</p> <ul style="list-style-type: none"> • How do I talk to my friends, family, and coworkers about my seizures? • Are there support organizations near me for people with epilepsy? • Are there any online support resources that you would recommend? • Are there any counseling or job support services you would recommend? • What activities should I be cautious about participating in? • How would taking one or more antiepileptic medications affect my life?

Please see Important Safety Information on pages 6 and 7, and additional patient information in the Medication Guide.



Sobre BRIVIACT

Tu proveedor de atención médica te recetará la dosis de BRIVIACT que considere más adecuada para ti. Es importante que tomes BRIVIACT como te lo indican tus proveedores de atención médica.

Considera hacer las siguientes preguntas mientras aprendes más sobre BRIVIACT y cómo tratar las convulsiones focales.

Esta información es para que aprendas más y mejores la comunicación con tu médico.

SI ESTÁS CONSIDERANDO BRIVIACT

- ¿Qué es BRIVIACT?
- ¿En qué se diferencia BRIVIACT de los otros medicamentos para las convulsiones?
- ¿BRIVIACT se debería tomar solo, como un medicamento adicional a mi medicación actual o cómo un reemplazo?
- ¿Qué puedo esperar de mi terapia si mi médico añade BRIVIACT a mi tratamiento?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de BRIVIACT?
- ¿Puedo tomar mis otros medicamentos mientras tomo BRIVIACT?

SI RECIENTEMENTE EMPEZASTE A TOMAR BRIVIACT

- ¿Debo tomar BRIVIACT a una determinada hora del día?
- ¿Qué hago si omito una dosis?
- ¿Cómo sé si BRIVIACT está funcionando?
- ¿Qué hago si tengo una convulsión mientras tomo BRIVIACT?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de BRIVIACT?
- ¿Qué hago si tengo efectos secundarios?
- ¿Los efectos secundarios desaparecen?
- ¿Necesito cambiar mi dosis de BRIVIACT?
- ¿Qué pasa si se me olvida renovar mi receta médica?
- ¿Qué tipo de ayuda financiera hay disponible? ¿Hay una tarjeta de copago?
- ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas con BRIVIACT?

Usa este espacio para escribir cualquier otra pregunta o tema que quieras hablar en tu próxima cita con el médico.

Por favor, leer la información de seguridad importante en las páginas 6 y 7, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

About BRIVIACT

Your healthcare provider will start you on a dose of BRIVIACT that he/she thinks will work best for you. It's important that you take BRIVIACT as prescribed by your healthcare provider.

Consider asking the following questions as you learn more about BRIVIACT and how it treats focal seizures.

This information is for you to learn more and to improve communication with your doctor.

IF YOU ARE CONSIDERING BRIVIACT

- What is BRIVIACT?
- How is BRIVIACT different from other seizure medications?
- Would BRIVIACT be taken alone, as an add-on to my current medication, or as a replacement?
- What can I expect from adding BRIVIACT to my therapy?
- What are the side effects of BRIVIACT?
- Can I still take my other medications while on BRIVIACT?

IF YOU RECENTLY STARTED TAKING BRIVIACT

- Should I take BRIVIACT at a certain time of day?
- What should I do if I miss a dose?
- How will I know if BRIVIACT is working?
- What should I do if I have a seizure while taking BRIVIACT?
- What are the side effects of BRIVIACT?
- What should I do if I experience side effects?
- Will side effects go away?
- Do I need to change my dose of BRIVIACT?
- What if I forget to refill my prescription?
- What type of financial assistance is available? Is there a copay card?
- What are the drug interactions for BRIVIACT?

Use this space to record any additional questions or topics you want to discuss at your next doctor's appointment.

Please see Important Safety Information on pages 6 and 7, and additional patient information in the Medication Guide.

BRIVIACT
(brivaracetam) 

INDICACIÓN

BRIVIACT® (brivaracetam) CV es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones de inicio parcial en personas de un mes de edad o más. Se desconoce si BRIVIACT es seguro y eficaz en niños menores de un mes de edad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- **Pensamientos o acciones suicidas:** al igual que otros medicamentos antiepilépticos, BRIVIACT puede provocar pensamientos o acciones suicidas en una cantidad mínima de personas, alrededor 1 de cada 500 personas que lo toman. Llama al proveedor de atención médica de inmediato si tienes alguno de estos síntomas, en especial si son nuevos, empeoran o te preocupan: pensamientos suicidas o relacionados con la muerte; intentos de suicidio; nueva depresión o empeoramiento de la depresión: nueva ansiedad o empeoramiento de la ansiedad; sentirse agitado o inquieto: ataques de pánico; problemas para dormir (insomnio); nueva irritabilidad o empeoramiento de la irritabilidad; actitud agresiva, sensación de enojo o conducta violenta; comportamiento impulsivo peligroso; aumento desmesurado de la actividad y del habla (manía); otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo.
- **Problemas del sistema nervioso:** La somnolencia, el cansancio y los mareos son frecuentes con BRIVIACT, pero pueden ser graves. BRIVIACT también puede causar problemas de equilibrio y coordinación. No conduzcas ni operes maquinaria hasta que sepas cómo te afecta BRIVIACT.
- **Síntomas mentales (psiquiátricos).** BRIVIACT puede provocar cambios en el estado de ánimo y la conducta, como agresión, agitación, enojo, ansiedad, apatía, cambios de humor, depresión, hostilidad e irritabilidad. Es común que BRIVIACT produzca irritabilidad y ansiedad, las cuales pueden ser graves. Las personas que toman BRIVIACT también pueden tener síntomas psicóticos, como alucinaciones (ver o escuchar cosas que realmente no están allí), delirios (pensamientos o creencias falsas o extrañas) y conducta inusual.
- **Los efectos secundarios más comunes:** En ensayos clínicos para pacientes adultos, los efectos secundarios más frecuentes de BRIVIACT incluyen somnolencia, mareos, sensación de cansancio, y náuseas y vómitos. Los efectos secundarios de BRIVIACT en niños de un mes de edad a menos de 16 años de edad son similares a los que se observan en adultos.
- **Reacciones alérgicas:** No tomes BRIVIACT si eres alérgico a brivaracetam o a cualquiera de sus ingredientes.
- **Suspender BRIVIACT:** No suspendas BRIVIACT sin antes hablar con el proveedor de atención médica. Suspender BRIVIACT de repente puede provocar convulsiones que no se detendrán (status epilepticus).
- **Embarazo:** Informa a tu proveedor de atención médica si estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si BRIVIACT dañará a tu bebé en gestación.
- **Lactancia:** Informa a tu proveedor de atención médica si estás amamantando o planeas amamantar. BRIVIACT pasa a la leche materna.
- **Abuso y dependencia:** BRIVIACT es una sustancia controlada a nivel federal (controlled substance, CV) porque puede ser objeto de abuso o generar dependencia. Informa a tu proveedor de atención médica si has abusado o has sido dependiente de medicamentos recetados, drogas ilegales o alcohol. Mantén BRIVIACT en un lugar seguro para evitar su uso indebido y abuso. La venta o el suministro de BRIVIACT podría dañar a otras personas y está prohibido por la ley.
- **Otras condiciones médicas:** Antes de tomar BRIVIACT, informa a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluso si tienes problemas hepáticos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BRIVIACT. Para obtener más información, habla con tu proveedor de atención médica o farmacéutico. Informa a tu proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que te genere molestia o que no desaparezca. Comunícate con tu médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puedes reportar los efectos secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088. También puedes informar los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando a UCBCares (1-844-599-CARE [2273]).

Por favor, ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

INDICATION

BRIVIACT® (brivaracetam) CV is a prescription medicine used to treat partial-onset seizures in people 1 month of age and older. It is not known if BRIVIACT is safe and effective in children younger than 1 month of age.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- **Suicidal thoughts or actions:** Like other antiepileptic drugs, BRIVIACT may cause suicidal thoughts or actions in a very small number of people, about 1 in 500 people taking it. Call a healthcare provider right away if you have any of these symptoms, especially if they are new, worse, or worry you: thoughts about suicide or dying; attempts to commit suicide; new or worse depression; new or worse anxiety; feeling agitated or restless; panic attacks; trouble sleeping (insomnia); new or worse irritability; acting aggressive, feeling angry, or being violent; acting on dangerous impulses; an extreme increase in activity and talking (mania); other unusual changes in behavior or mood. Before taking BRIVIACT, tell your healthcare provider if you have or had depression, mood problems, or suicidal thoughts or behavior.
- **Nervous system problems:** Drowsiness, tiredness, and dizziness are common with BRIVIACT, but can be severe. BRIVIACT can also cause problems with balance and coordination. Do not drive or operate machinery until you know how BRIVIACT affects you.
- **Mental (psychiatric) symptoms:** BRIVIACT can cause mood and behavior changes such as aggression, agitation, anger, anxiety, apathy, mood swings, depression, hostility, and irritability. Irritability and anxiety are common with BRIVIACT, and can be severe. People who take BRIVIACT can also get psychotic symptoms such as hallucinations (seeing or hearing things that are really not there), delusions (false or strange thoughts or beliefs), and unusual behavior.
- **Most common side effects:** In adult clinical trials, the most common side effects of BRIVIACT include sleepiness, dizziness, feeling tired, and nausea and vomiting. Side effects of BRIVIACT in children 1 month to less than 16 years of age are similar to those seen in adults.
- **Allergic reactions:** Do not take BRIVIACT if you are allergic to brivaracetam or any of the ingredients in BRIVIACT.
- **Stopping BRIVIACT:** Do not stop BRIVIACT without first talking to a healthcare provider. Stopping BRIVIACT suddenly can cause serious problems, including causing seizures that will not stop (status epilepticus).
- **Pregnancy:** Tell your healthcare provider if you are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if BRIVIACT will harm your unborn baby.
- **Breastfeeding:** Tell your healthcare provider if you are breastfeeding or plan to breastfeed. BRIVIACT passes into your breast milk.
- **Abuse and dependence:** BRIVIACT is a federally controlled substance (CV) because it can be abused or lead to dependence. Tell your healthcare provider if you have abused or been dependent on prescription medicines, street drugs, or alcohol in the past. Keep BRIVIACT in a safe place to prevent misuse and abuse. Selling or giving away BRIVIACT may harm others and is against the law.
- **Other medical conditions:** Before taking BRIVIACT, tell your healthcare provider about all of your medical conditions, including if you have liver problems.

These are not all the possible side effects of BRIVIACT. For more information, ask your healthcare provider or pharmacist. Tell your healthcare provider about any side effect that bothers you or that does not go away. Call your doctor for medical advice about side effects. You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088. You may also report side effects to UCB, Inc. at UCBCares (1-844-599-CARE [2273]).

Please see additional patient information in the Medication Guide.

BRIVIACT®
(brivaracetam)  



No son pacientes reales.
No actual patients are depicted.

 Inspired by patients.
Driven by science.

BRIVIACT® y UCBCares® son marcas registradas del UCB Group of Companies.
©2023 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080.
Todos los derechos reservados. All rights reserved.
US-BR-2300078

BRIVIACT® 
(brivaracetam) 