

# UNA GUÍA PARA PADRES Y CUIDADORES

## A GUIDE FOR PARENTS AND CAREGIVERS

**BRIVIACT®**  
(brivaracetam) ©



No son pacientes reales.  
No actual patients are depicted.

# CADA NIÑO MERECE CRECER CON MENOS CONVULSIONES FOCALES



Descubre cómo tu hijo puede tener menos convulsiones focales (también conocidas como convulsiones de inicio parcial) por tomar BRIVIACT solo o agregándolo a su tratamiento actual.

## INDICACIÓN

BRIVIACT® (brivaracetam) CV es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones de inicio parcial en personas de un mes de edad o más.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BRIVIACT puede provocar graves efectos secundarios, que incluyen acciones o pensamientos suicidas; somnolencia; cansancio; mareos; problemas en el equilibrio y la coordinación; cambios en el estado de ánimo y la conducta, que incluyen irritabilidad, ansiedad y síntomas psicóticos; y reacciones alérgicas a los ingredientes de BRIVIACT.

## AHORRA CON BRIVIACT

Encuentra detalles más adelante

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

# EVERY CHILD DESERVES TO GROW WITH FEWER FOCAL SEIZURES

**BRIVIACT®**  
(brivaracetam) CV

No son pacientes reales.  
No actual patients are depicted.

Discover how your child may experience fewer focal seizures (also known as partial-onset seizures) by taking BRIVIACT alone or adding it to their current treatment.

## INDICATION

BRIVIACT® (brivaracetam) CV is a prescription medicine used to treat partial-onset seizures in people 1 month of age and older.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BRIVIACT may cause serious side effects including suicidal thoughts or actions; drowsiness; tiredness; dizziness; balance and coordination problems; mood and behavior changes including irritability, anxiety, and psychotic symptoms; and allergic reactions to ingredients in BRIVIACT.

## SAVE ON BRIVIACT

Find more details inside

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.

# CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS CON CONVULSIONES FOCALES

Una convulsión puede ocurrir a cualquier edad, y cuando menos la esperas.

Nuevos casos de las convulsiones focales son comunes en el primer año de vida, pero son impredecibles y pueden ocurrir en cualquier momento. Como padres, deben estar preparados con la información y el tratamiento correcto.

Si tu niño es un bebé, niño pequeño o adolescente, y ha sido diagnosticado o ha estado luchando desde hace tiempo, hay esperanza. Puedes ayudar a reducir el número de convulsiones focales que tiene.

Usa este folleto para comprender mejor qué es BRIVIACT® (brivaracetam) CV. BRIVIACT no es para todo el mundo. Pregúntale al proveedor de atención médica de tu niño si BRIVIACT es adecuado para él/ella.

BRIVIACT es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones focales en personas de un mes de edad o más.

Se desconoce si BRIVIACT es seguro y eficaz en niños menores de un mes de edad.

¿Sabías que...  
**PUEDES AHORRAR CON BRIVIACT?**



Ver páginas 30 y 31 para más detalles.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Pensamientos o acciones suicidas:** Al igual que otros medicamentos antiepilepticos, BRIVIACT puede provocar acciones o pensamientos suicidas en una cantidad muy pequeña de personas, alrededor de 1 en 500 personas que lo toman. Llama a un proveedor de atención médica de inmediato si tienes alguno de estos síntomas, especialmente si son nuevos, empeoran o te preocupan: pensamientos suicidas o relacionados con la muerte; intentos de suicidio; nueva depresión o empeoramiento de la depresión; nueva ansiedad o empeoramiento de la ansiedad; sentirse agitado o inquieto; ataques de pánico; problemas para dormir (insomnio); nueva irritabilidad o empeoramiento de la irritabilidad; actitud agresiva, sensación de enojo o conducta violenta; comportamiento impulsivo peligroso; aumento desmesurado de la actividad y del habla (manía); otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo. Antes de tomar BRIVIACT, informa a tu proveedor de atención médica si tienes o tuviste depresión, problemas de estado de ánimo o pensamientos o conductas suicidas.

4 Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

# HOW TO HELP CHILDREN WITH FOCAL SEIZURES

A seizure can occur at any age, and when you least expect it.

New cases of focal seizures are most common in the first year of life but are unpredictable and can strike at any age. As a parent, you want to be prepared with the right information and treatment.

Whether your child is an infant, toddler, or teen, and has been recently diagnosed or struggling for some time, you should know there is hope. You may be able to help reduce the number of focal seizures your child is having.

Use this brochure to help you better understand BRIVIACT® (brivaracetam) CV. BRIVIACT may not be for everyone. Ask your child's healthcare provider if BRIVIACT is right for him/her.

BRIVIACT is a prescription medicine used to treat focal seizures in people 1 month of age and older.

It is not known if BRIVIACT is safe and effective in children younger than 1 month of age.

Did you know...  
**YOU CAN SAVE ON BRIVIACT?**

See pages 30 and 31 for more details.



## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Suicidal thoughts or actions:** Like other antiepileptic drugs, BRIVIACT may cause suicidal thoughts or actions in a very small number of people, about 1 in 500 people taking it. Call a healthcare provider right away if you have any of these symptoms, especially if they are new, worse, or worry you: thoughts about suicide or dying; attempts to commit suicide; new or worse depression; new or worse anxiety; feeling agitated or restless; panic attacks; trouble sleeping (insomnia); new or worse irritability; acting aggressive, feeling angry, or being violent; acting on dangerous impulses; an extreme increase in activity and talking (mania); other unusual changes in behavior or mood. Before taking BRIVIACT, tell your healthcare provider if you have or had depression, mood problems, or suicidal thoughts or behavior.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.



# Índice/Index

Página/Page

|   |    |
|---|----|
| ENTENDIENDO LA EPILEPSIA<br>UNDERSTANDING EPILEPSY  | 09 |
| CÓMO PUEDE AYUDAR BRIVIACT® (BRIVARACETAM) CV<br>HOW BRIVIACT® (BRIVARACETAM) CV CAN HELP | 12 |
| TOMANDO BRIVIACT<br>TAKING BRIVIACT   | 14 |
| LA APP DE MEDISAFE<br>MEDISAFE APP  | 18 |
| INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE<br>IMPORTANT SAFETY INFORMATION                       | 22 |
| RECURSOS ÚTILES<br>HELPFUL RESOURCES  | 28 |
| AHORRA CON BRIVIACT<br>SAVE ON BRIVIACT   | 30 |
| ¿TIENES MÁS PREGUNTAS?<br>HAVE MORE QUESTIONS?  | 32 |

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.



No son pacientes reales.  
No actual patients are depicted.

## ENTENDIENDO LA EPILEPSIA

Como padre o cuidador de un niño, sabes **el impacto que tienen las convulsiones focales en su vida diaria**. Entendiendo la epilepsia es una parte importante de cuidar a un niño para que tenga la oportunidad de aprender, jugar y crecer.

## UNDERSTANDING EPILEPSY

As a parent or caregiver of a child, you know **the impact focal seizures can have on your child's daily life**. Understanding epilepsy is an important part of caring for your child so they have the chance to learn, play, and grow.

Alrededor de 3.4 millones de personas viven con epilepsia en los Estados Unidos.

Casi **470,000**  
de ellos son niños.



Around 3.4 million people in the United States are living with epilepsy.

About **470,000**  
of them are children.

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.

# ENTENDIENDO LA EPILEPSIA (CONT.)

## ¿Qué es la epilepsia?

- La epilepsia es un trastorno cerebral que causa convulsiones repetidas e impredecibles
- Una convulsión es causada por una alteración en la actividad eléctrica normal del cerebro
- Una persona puede ser diagnosticada con epilepsia si tiene dos o más convulsiones separadas por más de 24 horas

Las convulsiones focales son el tipo más común de convulsiones infantiles.

# UNDERSTANDING EPILEPSY (CONT.)



## What is epilepsy?

- Epilepsy is a condition of the brain causing repeated and unpredictable seizures
- A seizure is caused by a disturbance in the normal electrical activity of the brain
- Someone may be diagnosed with epilepsy if they experience 2 or more of these seizures separated by more than 24 hours

Focal seizures are the most common type of seizure in children.

Aproximadamente dos tercios de las convulsiones infantiles son convulsiones focales.

Approximately two-thirds of seizures in children are focal seizures.

## Las convulsiones focales:

- Pueden ser graves y pueden afectar la capacidad del niño de responder a lo que sucede a su alrededor
- Pueden ser difíciles de detectar en su niño

## Focal seizures:

- Can be serious and can affect your child's ability to respond to what's happening around them
- May be hard to recognize in your child

Visita **BRIVIACT.com** para aprender más sobre los diferentes tipos de convulsiones focales y como BRIVIACT puede ayudar.

Go to **BRIVIACT.com** to learn more about the different types of focal seizures and how BRIVIACT may help.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Problemas del sistema nervioso:** La somnolencia, el cansancio y los mareos son frecuentes con BRIVIACT, pero pueden ser graves. BRIVIACT también puede causar problemas en el equilibrio y la coordinación. No conduzcas ni operes maquinaria hasta que sepas de qué forma te afecta BRIVIACT.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Nervous system problems:** Drowsiness, tiredness, and dizziness are common with BRIVIACT, but can be severe. BRIVIACT can also cause problems with balance and coordination. Do not drive or operate machinery until you know how BRIVIACT affects you.

## CÓMO PUEDE AYUDAR BRIVIACT

¿Cómo puede ayudar BRIVIACT a mi hijo?

BRIVIACT es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones focales en personas de **un mes de edad o más**.

BRIVIACT puede **tomarse solo o se puede agregar a un tratamiento actual** para ayudar a controlar las convulsiones focales. BRIVIACT puede ayudar a reducir la cantidad de convulsiones focales que tiene tu hijo.

## HOW BRIVIACT CAN HELP

**BRIVIACT**  
(*brivaracetam*)<sup>®</sup>

How can BRIVIACT help my child?

BRIVIACT is a prescription medicine used to treat focal seizures in people **1 month of age and older**.

BRIVIACT can be **taken alone or may be added to an existing seizure medicine** to help control focal seizures. BRIVIACT may help reduce the number of focal seizures your child is having.

### PUEDES AHORRAR CON BRIVIACT.\*

Consulta las páginas 30 y 31 para más detalles sobre la tarjeta de ahorros para pacientes de BRIVIACT.

\*Sujeto a elegibilidad. Se aplican términos y condiciones.

### YOU CAN SAVE ON BRIVIACT.\*

Check pages 30 and 31 for details on the BRIVIACT Patient Savings Card.

\*Subject to eligibility. Terms and Conditions apply.



No son pacientes reales.  
No actual patients are depicted.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Síntomas mentales (psiquiátricos):** BRIVIACT puede provocar cambios en el estado de ánimo y la conducta, como agresión, agitación, enojo, ansiedad, apatía, cambios de humor, depresión, hostilidad e irritabilidad. Es común que BRIVIACT produzca irritabilidad y ansiedad, las cuales pueden ser graves. Las personas que toman BRIVIACT también pueden tener síntomas psicóticos, como alucinaciones (ver o escuchar cosas que realmente no están allí), delirios (pensamientos o creencias falsas o extrañas) y conducta inusual.

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, 12 y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Mental (psychiatric) symptoms:** BRIVIACT can cause mood and behavior changes such as aggression, agitation, anger, anxiety, apathy, mood swings, depression, hostility, and irritability. Irritability and anxiety are common with BRIVIACT, and can be severe. People who take BRIVIACT can also get psychotic symptoms such as hallucinations (seeing or hearing things that are really not there), delusions (false or strange thoughts or beliefs), and unusual behavior.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.

# TOMANDO BRIVIACT

El médico de tu hijo le recetará una dosis y formulación adecuada de BRIVIACT basada en sus necesidades. Sin embargo, puede ser difícil hacer que los niños tomen su medicamento. Por eso, BRIVIACT tiene 2 opciones para formulaciones orales: tabletas y una presentación líquida con sabor a frambuesa.



(No es el tamaño actual)

## TABLETAS DE BRIVIACT

Las tabletas de BRIVIACT vienen en múltiples dosis, y deben tomarse enteras. No tritures ni mastiques las tabletas antes de tragárlas.



## SOLUCIÓN ORAL DE BRIVIACT

Si tu hijo tiene problemas con tomar tabletas, puede tomar BRIVIACT en su presentación líquida.

# TAKING BRIVIACT

**BRIVIACT**  
(brivaracetam)®

Your child's doctor will prescribe an appropriate dose and formulation of BRIVIACT based on your child's needs. However, it can be challenging to get some kids to take their medicine. That's why BRIVIACT has 2 options for oral formulations: tablets and a raspberry-flavored liquid.



(Not actual size)

## BRIVIACT TABLETS

BRIVIACT tablets come in multiple doses and should be taken whole. Do not crush or chew tablets before swallowing.



## BRIVIACT ORAL SOLUTION

If your child has trouble taking pills, he or she can take BRIVIACT as a liquid.



La esperanza es que un niño nunca tenga que ir al hospital. Pero si tiene que ir y no puede tragar la solución oral o las tabletas, **un proveedor de atención médica puede administrar BRIVIACT en forma intravenosa.**

The hope is that a child never has to go to the hospital. But if they do and they can't swallow the oral solution or tablets, **a healthcare professional can give BRIVIACT through the vein (intravenous).**

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Reacciones alérgicas:** No tomes BRIVIACT si eres alérgico a brivaracetam o a cualquiera de sus ingredientes.

Ver la guía del medicamento para pacientes incluida para la lista de componentes de BRIVIACT.

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Allergic reactions:** Do not take BRIVIACT if you are allergic to brivaracetam or any of the ingredients in BRIVIACT.

See the patient Medication Guide included for a list of ingredients in BRIVIACT.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.



Recuerda esta información cuando le administres BRIVIACT a tu hijo:

- No suspendas BRIVIACT sin antes hablar con el proveedor de atención médica.
- **Suspender BRIVIACT de repente puede causar problemas graves.** Suspender un medicamento para las convulsiones de repente puede provocar convulsiones que no se detendrán (status epilepticus)
- **Si tu médico decide suspender el tratamiento de BRIVIACT de tu hijo,** le dará instrucciones para que deje de tomar BRIVIACT lentamente
- Si tu médico te ha recetado la solución oral de BRIVIACT, asegúrate de **pedirle a tu farmacéutico un gotero o una taza de medidas** para medicamentos que te ayuda a medir la cantidad correcta de solución oral de BRIVIACT. No uses una cucharita o cuchara de cocina. **Pídele a tu farmacéutico instrucciones** sobre cómo usar el dispositivo de medición de la manera correcta
- Tu hijo debe tomar BRIVIACT **exactamente como indica el médico**
- El médico de tu hijo te informará **cuánto** BRIVIACT debe tomarse y **cuándo** hacerlo
- Si tu hijo toma demasiado BRIVIACT, **llama al Centro de Control de Toxicología local de inmediato**
- Tu hijo puede tomar BRIVIACT **con o sin alimentos**
- BRIVIACT se pueden guardar a **temperatura ambiente**

**¿Tienes más preguntas? Recuerda preguntarle al médico o equipo de atención médica de tu hijo.**

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Abuso y dependencia:** BRIVIACT es una sustancia controlada a nivel federal (controlled substance, CV) porque puede ser objeto de abuso o generar dependencia. Informa a tu proveedor de atención médica si has abusado o has sido dependiente de medicamentos recetados, drogas ilegales o alcohol. Mantén BRIVIACT en un lugar seguro para evitar su uso indebido y abuso. La venta o el suministro de BRIVIACT podría dañar a otras personas y están prohibidos por ley.

**Otras condiciones médicas:** Antes de tomar BRIVIACT, informa a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluso si tienes problemas hepáticos.

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, 16 y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

Remember this information when giving your child BRIVIACT:

- Never stop taking BRIVIACT without first talking to your healthcare provider
  - **Stopping BRIVIACT suddenly can cause serious problems.** Stopping a seizure medicine suddenly can cause seizures that will not stop (status epilepticus)
  - **If your doctor decides to stop your child's BRIVIACT treatment,** he or she will give you instructions on how to slowly stop taking BRIVIACT
- If your healthcare provider has prescribed BRIVIACT oral solution, be sure to **ask your pharmacist for a medicine dropper or medicine cup** to help you measure the correct amount of BRIVIACT oral solution. Do not use a household teaspoon or tablespoon. **Ask your pharmacist for instructions** on how to use the measuring device the right way
- Your child should take BRIVIACT **exactly as his or her doctor has instructed**
- Your child's doctor will tell you **how much** BRIVIACT to take and **when** to take it
- If your child takes too much BRIVIACT, **call your local Poison Control Center immediately**
- Your child can take BRIVIACT **with or without food**
- BRIVIACT can be stored at **room temperature**

**Have more questions? Remember to ask your child's doctor or healthcare team.**

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Abuse and dependence:** BRIVIACT is a federally controlled substance (CV) because it can be abused or lead to dependence. Tell your healthcare provider if you have abused or been dependent on prescription medicines, street drugs, or alcohol in the past. Keep BRIVIACT in a safe place to prevent misuse and abuse. Selling or giving away BRIVIACT may harm others and is against the law.

**Other medical conditions:** Before taking BRIVIACT, tell your healthcare provider about all of your medical conditions, including if you have liver problems.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.

# ¿NECESITAS AYUDA PARA MANEJAR LOS MEDICAMENTOS DE TU HIJO? PRUEBA MEDISAFE®

Medisafe es una aplicación gratuita para ayudar a tu hijo a tomar sus medicamentos exactamente como los recetó su médico.

Manténte al día y en control con funciones como:



Recordatorios personalizados para medicamentos, renovación de recetas y citas



Recursos útiles y más

## NEED HELP MANAGING YOUR CHILD'S MEDICATION? TRY MEDISAFE®

**BRIVIACT®**  
(brivaracetam)©

Medisafe is a free app to help your child take their medication exactly as prescribed.

Stay on track and in control with features like:



Personalized medication, refill, and appointment reminders




Helpful resources and more

## Dos formas de conseguir Medisafe

**1. Descarga** la app de Medisafe en [MedisafeApp.com](http://MedisafeApp.com) en tu smartphone.



**2. Escanea** el código QR debajo usando la cámara de tu celular.




## Two ways to get Medisafe

**1. Download** the Medisafe app at [MedisafeApp.com](http://MedisafeApp.com) on your smartphone.



**2. Scan** the QR code below using your phone camera.



Una vez que descargas Medisafe a tu smartphone, simplemente:

**TOCA**  
“Añadir una medicina”

**ESCRIBE**  
“BRIVIACT”

**REGÍSTRATE**  
como un cuidador

Once Medisafe is on your smartphone, simply:

**TAP**  
“Add your med”

**TYPE**  
“BRIVIACT”

**ENROLL**  
as a caregiver



No son pacientes reales.  
No actual patients are depicted.



Lleva un registro de las convulsiones de tu hijo para que puedas compartir la información con su médico en su próxima cita.

Visita [BRIVIACT.com/tools-resources](http://BRIVIACT.com/tools-resources)



Record your child's seizures so you can share the information with their doctor at their next appointment.

Go to [BRIVIACT.com/tools-resources](http://BRIVIACT.com/tools-resources)

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Efectos secundarios más frecuentes:** En ensayos clínicos para pacientes adultos, los efectos secundarios más frecuentes de BRIVIACT incluyen somnolencia, mareos, sensación de cansancio, y náuseas y vómitos. Los efectos secundarios de BRIVIACT en niños de un mes de edad a menos de 16 años de edad son similares a los que se observan en adultos.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Most common side effects:** In adult clinical trials, the most common side effects of BRIVIACT include sleepiness, dizziness, feeling tired, and nausea and vomiting. Side effects of BRIVIACT in children 1 month to less than 16 years of age are similar to those seen in adults.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Edúcate sobre la información de seguridad importante y habla con el médico de tu hijo sobre cualquier preocupación o si ocurre cualquier cosa fuera de lo común.

## ¿Qué es BRIVIACT?

BRIVIACT® (brivaracetam) CV es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones de inicio parcial en personas de un mes de edad o más. Se desconoce si BRIVIACT es seguro y eficaz en niños menores de un mes de edad.

## ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BRIVIACT?

BRIVIACT es una sustancia controlada a nivel federal (controlled substance, CV) porque puede ser objeto de abuso o generar dependencia. Mantén BRIVIACT en un lugar seguro para evitar su uso indebido y abuso. La venta o el suministro de BRIVIACT podría dañar a otras personas y están prohibidos por ley.

Al igual que otros medicamentos antiepilépticos, BRIVIACT puede provocar acciones o pensamientos suicidas en una cantidad muy pequeña de personas, alrededor de 1 en 500 personas que lo toman.

Llama al proveedor de atención médica de inmediato si tienes alguno de estos síntomas, en especial si son nuevos, empeoran o te preocupan:

- Pensamientos suicidas o relacionados con la muerte.
- Nueva depresión o empeoramiento de la depresión.
- Sentirse agitado o inquieto.
- Problemas para dormir (insomnio).
- Actitud agresiva, sensación de enojo o conducta violenta.
- Aumento desmesurado de la actividad y del habla (mania).
- Intentos de suicidio.
- Nueva ansiedad o empeoramiento de la ansiedad.
- Ataques de pánico.
- Nueva irritabilidad o empeoramiento de la irritabilidad.
- Comportamiento impulsivo peligroso.
- Otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION



Be educated about the Important Safety Information and talk to your child's doctor about concerns you may have or should anything out of the ordinary take place.

## What is BRIVIACT?

BRIVIACT® (brivaracetam) CV is a prescription medicine used to treat partial-onset seizures in people 1 month of age and older. It is not known if BRIVIACT is safe and effective in children younger than 1 month of age.

## What is the most important information I should know about BRIVIACT?

BRIVIACT is a federally controlled substance (CV) because it can be abused or lead to dependence. Keep BRIVIACT in a safe place to prevent misuse and abuse. Selling or giving away BRIVIACT may harm others and is against the law.

Like other antiepileptic drugs, BRIVIACT may cause suicidal thoughts or actions in a very small number of people, about 1 in 500 people taking it.

Call a healthcare provider right away if you have any of these symptoms, especially if they are new, worse, or worry you:

- thoughts about suicide or dying
- attempts to commit suicide
- new or worse depression
- new or worse anxiety
- feeling agitated or restless
- panic attacks
- trouble sleeping (insomnia)
- new or worse irritability
- acting aggressive, feeling angry, or being violent
- acting on dangerous impulses
- an extreme increase in activity and talking (mania)
- other unusual changes in behavior or mood

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

No suspendas BRIVIACT sin antes hablar con el proveedor de atención médica.

- Suspender BRIVIACT de repente puede causar problemas graves.
- Suspender un medicamento para las convulsiones de repente puede provocar convulsiones que no se detendrán (status epilepticus).

## ¿Quién no debe tomar BRIVIACT?

No tomes BRIVIACT si eres alérgico a brivaracetam o a cualquiera de sus ingredientes.

## ¿Qué debería informarle al médico antes de comenzar a tomar BRIVIACT?

Antes de tomar BRIVIACT, informa a tu proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Tienes o tuviste depresión, problemas de estado de ánimo o pensamientos o conductas suicidas.
- Tienes problemas hepáticos.
- Has abusado o has sido dependiente de medicamentos recetados, drogas ilegales o alcohol.
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si BRIVIACT dañará a tu bebé en gestación.
- Estás amamantando o planeas amamantar. BRIVIACT pasa a la leche materna.

## ¿Qué debo evitar mientras tomo BRIVIACT?

No conduzas ni operes maquinaria hasta que sepas de qué forma te afecta BRIVIACT. BRIVIACT podría causar somnolencia, cansancio, mareos y problemas con tu equilibrio y coordinación.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BRIVIACT?

BRIVIACT podría causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Consulta “**¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre BRIVIACT?**”
- **Problemas del sistema nervioso.** La somnolencia, el cansancio y los mareos son frecuentes con BRIVIACT, pero pueden ser graves. Consulta “**¿Qué debo evitar mientras tomo BRIVIACT?**”. BRIVIACT también puede causar problemas en el equilibrio y la coordinación.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)

**Do not stop BRIVIACT without first talking to a healthcare provider.**

- Stopping BRIVIACT suddenly can cause serious problems.
- Stopping a seizure medicine suddenly can cause seizures that will not stop (status epilepticus).

## Who should not take BRIVIACT?

Do not take BRIVIACT if you are allergic to brivaracetam or any of the ingredients in BRIVIACT.

## What should I tell my healthcare provider before starting BRIVIACT?

Before taking BRIVIACT, tell your healthcare provider about all of your medical conditions, including if you:

- have or had depression, mood problems, or suicidal thoughts or behavior.
- have liver problems.
- have abused or been dependent on prescription medicines, street drugs, or alcohol.
- are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if BRIVIACT will harm your unborn baby.
- are breastfeeding or plan to breastfeed. BRIVIACT passes into your breast milk.

## What should I avoid while taking BRIVIACT?

Do not drive or operate machinery until you know how BRIVIACT affects you. BRIVIACT may cause drowsiness, tiredness, dizziness, and problems with your balance and coordination.

## What are the possible side effects of BRIVIACT?

BRIVIACT may cause serious side effects, including:

- See “**What is the most important information I should know about BRIVIACT?**”
- **Nervous system problems.** Drowsiness, tiredness, and dizziness are common with BRIVIACT, but can be severe. See “**What should I avoid while taking BRIVIACT?**” BRIVIACT can also cause problems with balance and coordination.



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BRIVIACT? (cont.)

- **Síntomas mentales (psiquiátricos):** BRIVIACT puede provocar cambios en el estado de ánimo y la conducta, como agresión, agitación, enojo, ansiedad, apatía, cambios de humor, depresión, hostilidad e irritabilidad. Es común que BRIVIACT produzca irritabilidad y ansiedad, las cuales pueden ser graves. Las personas que toman BRIVIACT también pueden tener síntomas psicóticos, como alucinaciones (ver o escuchar cosas que realmente no están allí), delirios (pensamientos o creencias falsas o extrañas) y conducta inusual.

### Los efectos secundarios más frecuentes de BRIVIACT en los adultos incluyen:

- Somnolencia
- Mareos
- Sensación de cansancio
- Náuseas y vómitos

Los efectos secundarios de BRIVIACT en niños de un mes de edad a menos de 16 años de edad son similares a los que se observan en adultos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BRIVIACT. Para obtener más información, habla con tu proveedor de atención médica o farmacéutico. Informa a tu proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que te genere molestia o que no desaparezca. Comunícate con tu médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puedes reportar los efectos secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088. También puedes informar los efectos secundarios a UCB, Inc. llamando a UCBCares (1-844-599-CARE [2273]).

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONT.)



### What are the possible side effects of BRIVIACT? (cont.)

- **Mental (psychiatric) symptoms:** BRIVIACT can cause mood and behavior changes such as aggression, agitation, anger, anxiety, apathy, mood swings, depression, hostility, and irritability. Irritability and anxiety are common with BRIVIACT, and can be severe. People who take BRIVIACT can also get psychotic symptoms such as hallucinations (seeing or hearing things that are really not there), delusions (false or strange thoughts or beliefs), and unusual behavior.

### The most common side effects of BRIVIACT in adults include:

- sleepiness
- dizziness
- feeling tired
- nausea and vomiting

Side effects of BRIVIACT in children 1 month to less than 16 years of age are similar to those seen in adults.

These are not all the possible side effects of BRIVIACT. For more information, ask your healthcare provider or pharmacist. Tell your healthcare provider about any side effect that bothers you or that does not go away. Call your doctor for medical advice about side effects. You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) or call 1-800-FDA-1088. You may also report side effects to UCB, Inc. at UCBCares (1-844-599-CARE [2273]).

## RECURSOS ÚTILES

Tenemos la información y herramientas necesarias para que tú y tu hijo aprendan a manejar las convulsiones focales. Tómate unos minutos para conocer los recursos que están disponibles en [BRIVIACT.com/tools-resources](http://BRIVIACT.com/tools-resources) y aprende cómo pueden hacer una diferencia en el tratamiento de tu hijo.



**Diario de las convulsiones:** Te permite llevar un registro de las convulsiones de tu hijo y ofrecer un panorama más completo a tu médico de dónde, cuándo y que tan seguido ocurren las convulsiones



**Guía de cuidadores para registrar convulsiones:** Aprende cómo llevar un registro de los detalles de las convulsiones de tu hijo para que el médico pueda hacer un diagnóstico y tomen una decisión del tratamiento



**Otros recursos para la epilepsia:** Encuentra una lista de organizaciones enfocadas en la investigación, cuidado y apoyo de la epilepsia

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

**Pensamientos o acciones suicidas:** Al igual que otros medicamentos antiepilepticos, BRIVIACT puede provocar acciones o pensamientos suicidas en una cantidad muy pequeña de personas, alrededor de 1 en 500 personas que lo toman. Llama a un proveedor de atención médica de inmediato si tienes alguno de estos síntomas, especialmente si son nuevos, empeoran o te preocupan: pensamientos suicidas o relacionados con la muerte; intentos de suicidio; nueva depresión o empeoramiento de la depresión; nueva ansiedad o empeoramiento de la ansiedad; sentirse agitado o inquieto; ataques de pánico; problemas para dormir (insomnio); nueva irritabilidad o empeoramiento de la irritabilidad; actitud agresiva, sensación de enojo o conducta violenta; comportamiento impulsivo peligroso; aumento desmesurado de la actividad y del habla (manía); otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo. Antes de tomar BRIVIACT, informa a tu proveedor de atención médica si tienes o tuviste depresión, problemas de estado de ánimo o pensamientos o conductas suicidas.

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

## HELPFUL RESOURCES



We're here with the information and tools you need as a caregiver to help you and your child learn about and manage focal seizures. Take a few minutes to get to know the resources available at [BRIVIACT.com/tools-resources](http://BRIVIACT.com/tools-resources) and learn how they can help make a difference for your child's treatment journey.



**Seizure Diary:** Allows you to record your child's seizures and provide a more complete picture for your doctor of where, when, and how often seizures occur



**Caregiver Guide to Recording Seizures:** Learn how you can help by recording the details of your child's seizures in order to assist the doctor in making a diagnosis and discussing treatment decisions



**Other Epilepsy Resources:** Find a list of organizations focused on epilepsy research, care, and support

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**Suicidal thoughts or actions:** Like other antiepileptic drugs, BRIVIACT may cause suicidal thoughts or actions in a very small number of people, about 1 in 500 people taking it. Call a healthcare provider right away if you have any of these symptoms, especially if they are new, worse, or worry you: thoughts about suicide or dying; attempts to commit suicide; new or worse depression; new or worse anxiety; feeling agitated or restless; panic attacks; trouble sleeping (insomnia); new or worse irritability; acting aggressive, feeling angry, or being violent; acting on dangerous impulses; an extreme increase in activity and talking (mania); other unusual changes in behavior or mood. Before taking BRIVIACT, tell your healthcare provider if you have or had depression, mood problems, or suicidal thoughts or behavior.

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.

## AHORRA CON BRIVIACT

¿Estás asegurado comercialmente? Podrías ahorrar en los medicamentos recetados de BRIVIACT para tu hijo.

Una tarjeta de ahorros funciona como un cupón—puedes llevarla a la farmacia y ahorrar dinero en tu copago por el medicamento recetado de tu hijo.

Visita [www.BRIVIACT.com](http://www.BRIVIACT.com) para verificar la elegibilidad y registrarte para una tarjeta de ahorros.

**Si eres un paciente elegible,\* puedes pagar tan solo \$10 por suministro de BRIVIACT por 30 días.**

## SAVE ON BRIVIACT



Are you commercially insured? You could save on your child's BRIVIACT prescription.

A savings card works like a coupon—you can take it to your pharmacist and save money on your copay for your child's prescription.

Visit [www.BRIVIACT.com](http://www.BRIVIACT.com) to check eligibility and register for a savings card.



**If you qualify,\* you may pay as little as \$10 for each 30-day supply of BRIVIACT.**

\*Visita BRIVIACT.com para términos y condiciones adicionales.

\*See BRIVIACT.com for additional Terms and Conditions.

## ¿TIENES MÁS PREGUNTAS?

Habla con un enfermero especializado o tu farmacéutico.

UCBCares® es un equipo de profesionales (enfermeros y farmacéuticos) de salud y profesionales de servicio al cliente altamente preparados y experimentados que te pueden ayudar con cualquier pregunta que tengas sobre BRIVIACT, ahorros, asistencia financiera y más.

### COMUNÍCATE CON **UCBCares®** About People

para hablar con nuestro equipo de enfermeros, farmacéuticos y profesionales de servicio al cliente



Llama al 1-844-599-CARE (2273)



Manda un email a [ucbcares@ucb.com](mailto:ucbcares@ucb.com)



Envía tu pregunta en línea a [askucbcares.com](http://askucbcares.com)

## HAVE MORE QUESTIONS?

**BRIVIACT®**  
(brivaracetam) C

Speak to a specialized nurse or pharmacist.

UCBCares® is a team of knowledgeable, experienced healthcare professionals (nurses and pharmacists) and customer service professionals who can guide you through questions you may have about BRIVIACT, savings, financial assistance, and more.

### CONTACT

### **UCBCares®** About People

to talk to our team of nurses, pharmacists, and customer service professionals.



Call 1-844-599-CARE (2273)



Email [ucbcares@ucb.com](mailto:ucbcares@ucb.com)



Submit your question online at [askucbcares.com](http://askucbcares.com)



¿Te interesa aprender más sobre BRIVIACT? Visita [BRIVIACT.com](http://BRIVIACT.com).

Interested in learning more about BRIVIACT?  
Visit [BRIVIACT.com](http://BRIVIACT.com).

# AYUDA A DARLES UNA INFANCIA CON MÁS MEMORIAS Y MENOS CONVULSIONES FOCALES

HELP GIVE THEM A CHILDHOOD FILLED WITH MORE MEMORIES AND FEWER FOCAL SEIZURES

No son pacientes reales.  
No actual patients are depicted.

## INDICACIÓN

BRIVIACT® (brivaracetam) CV es un medicamento recetado usado para tratar las convulsiones de inicio parcial en personas de un mes de edad o más.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

BRIVIACT puede provocar graves efectos secundarios, que incluyen acciones o pensamientos suicidas; somnolencia; cansancio; mareos; problemas en el equilibrio y la coordinación; cambios en el estado de ánimo y la conducta, que incluyen irritabilidad, ansiedad y síntomas psicóticos; y reacciones alérgicas a los ingredientes de BRIVIACT. Los efectos secundarios más frecuentes de BRIVIACT incluyen somnolencia, mareos, sensación de cansancio, y náuseas y vómitos. Los efectos secundarios de BRIVIACT en niños de un mes de edad a menos de 16 años de edad son similares a los que se observan en adultos.

BRIVIACT es una sustancia controlada a nivel federal (controlled substance, CV) porque puede ser objeto de abuso o generar dependencia.

Puedes reportar los efectos secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visita [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088. También puedes informar los efectos secundarios a UCB, Inc. Llamando a UCBCare (1-844-599-CARE [2273]).

Por favor, leer la información de seguridad importante de las páginas 22 a 27, y ver información adicional para pacientes en la guía del medicamento.

## INDICATION

BRIVIACT® (brivaracetam) CV is a prescription medicine used to treat partial-onset seizures in people 1 month of age and older.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BRIVIACT may cause serious side effects including suicidal thoughts or actions; drowsiness; tiredness; dizziness; balance and coordination problems; mood and behavior changes including irritability, anxiety, and psychotic symptoms; and allergic reactions to ingredients in BRIVIACT.

The most common side effects of BRIVIACT include sleepiness, dizziness, feeling tired, and nausea and vomiting. Side effects of BRIVIACT in children 1 month to less than 16 years of age are similar to those seen in adults.

BRIVIACT is a federally controlled substance (CV) because it can be abused or lead to dependence.

You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA. Visit [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) or call 1-800-FDA-1088. You may also report side effects to UCB, Inc. at UCBCare (1-844-599-CARE [2273]).

Please see Important Safety Information on pages 22 to 27, and please see additional patient information in the Medication Guide.

BRIVIACT® y UCBCare® son marcas registradas del UCB Group of Companies. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2023 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080. Todos los derechos reservados.

BRIVIACT® and UCBCare® are registered trademarks of the UCB Group of Companies. All other trademarks are the property of their respective holders.

©2023 UCB, Inc., Smyrna, GA 30080. All rights reserved. US-BR-2300058

**BRIVIACT®**  
(brivaracetam) CV